

Dexacort[®]

**NAFAZOLINA - CLORFENIRAMINA - DEXAMETASONA
DESCONGESTIVO - ANTIALÉRGICO - ANTIINFLAMATORIO**

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución contiene:

Nafazolina Clorhidrato.....	1 mg
Clorfeniramina Maleato.....	1 mg
Dexametasona Fosfato Sódico.....	0,05 mg
Excipientes.....	c.s.p.

INDICACIONES

Rinitis, rinoфарингитis, sinusitis, estados inflamatorios y alérgicos de las vías nasales, laringitis, resfríos comunes, gripe.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Dexacort tiene una actividad vasoconstrictora, antialérgica y descongestiva de las vías rinofaríngeas. Por ende, constituye una terapéutica eficaz para aliviar los procesos inflamatorios y alérgicos del tracto rinosinusal.

Nafazolina: Produce vasoconstricción por acción local y adrenérgica sobre los vasos sanguíneos de la conjuntiva o de la mucosa nasal. Se absorbe por todas las vías, incluido el tracto gastrointestinal.

Clorfeniramina: Como todos los antihistamínicos compite con la Histamina por los sitios receptores H1 en los músculos lisos de los bronquios. Se absorbe bien desde las vías GI, su acción comienza de 30 a 60 minutos y llega a su máximo en 2 a 6 horas. Se distribuye ampliamente en el cuerpo, se une a proteínas en un 72%. Se metaboliza en gran parte en las células de la mucosa GI y en el hígado y se excreta en la orina.

Dexametasona: Acción antiinflamatoria, estimula la síntesis de las enzimas necesarias para disminuir la respuesta inflamatoria. Se absorbe con facilidad, y sus efectos máximos ocurren en 1 a 2 horas, se distribuye en los músculos, hígado, piel, intestinos y riñones. Se metaboliza en el hígado en metabolitos glucoronidos y sulfatos inactivos. Se excreta por los riñones y también en las heces.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Salvo indicación médica se recomienda instilar una o dos gotas en cada fosa nasal cada 4 a 6 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad a sus componentes, embarazo, lactancia. No se usará en pacientes con insuficiencia renal o bacterianas no controlados por fármacos antiinfecciosos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Los antihistamínicos se usarán con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, en pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión o hipertiroidismo. La Dexametasona se usará con extrema precaución en pacientes con úlcera GI, enfermedad renal, osteoporosis, diabetes, trastornos tromboembólicos. La Nafazolina se usará con precaución en enfermo con hipertiroidismo, cardiopatías, hipertensión y los de edad avanzada.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

Sedación, letargo, cefalea, fatiga, estimulación del apetito, sequedad bucal, estreñimiento, urticaria, nerviosismo, inquietud, aumento de peso. El medicamento se suspenderá si se presenta reacciones de hipersensibilidad. Este preparado no está indicado

en afecciones oculares.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La Clorfeniramina aumenta los efectos de la adrenalina y puede disminuir los efectos de la sulfonilurea y contrarresta parcialmente la acción anticoagulante de la heparina. El uso concomitante de barbitúricos, fenitoína y rifampicina puede causar disminución de los efectos corticoides por aumento del metabolismo hepático; los antiácidos reducen el efecto corticoide por absorber a éste último disminuyendo la cantidad absorbida. El uso conjunto con IMAO, puede producir aumento de la respuesta adrenérgica y crisis de hipertensión.

SOBREDOSIS (Signos, Síntomas y Tratamiento)

En caso de intoxicación o sobredosis acudir al hospital mas cercano o al Centro Nacional de Toxicología, sito en Avda. Gral. Santos Teodoro S. Mongelos, o llamar al Teléfono (021) 204 800/204 908 o al 911. Asunción.

RESTRICCIONES DE USO

Embarazo y Lactancia.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 1 frasco de 15 mL.

Mantener en lugar fresco a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en su envase original hasta su total utilización.

DR. LA SALUD DE SU PACIENTE ES TAMBIÉN
NUESTRO COMPROMISO.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA.

La consulta médica regular, es uno de los pilares
de la Medicina Preventiva.

Consulte con su médico periódicamente.

Fabricado por

Laboratorios Almos S.A.

Administración y Planta Industrial

Ruta PY01, Km 20, N°: 3063. Ciudad de Ypané.

Departamento Central. Paraguay.

Teléfono: (021) 614 313 R.A.

Dir. Téc: Qca. Fca. Teresa Tanaka - Reg. Prof. N°: 1.663.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Reg. Sanit. N°: 06345-06-EF

En caso de Reacciones Adversas al producto comunicarse a:

farmacovigilancia@siegfried.com.py

o al Teléfono: (021) 614 313 R.A.



SIEGFRIED

VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA PARAGUAYA