

Pectos®

DEXTROMETORFANO 15 mg / 1 mL

ANTITUSIVO

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Dextrometorfano Bromhidrato.....15 mg

Excipientes.....c.s.p.

INDICACIONES

Tos de diversas etiologías en niños y adultos. Faringitis, gripe, bronquitis, traqueítis, tos irritativa rebelde o nerviosa.

En el postoperatorio, en los accesos de tos en la neoplasia pulmonar, enfisema.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

El Dextrometorfano se absorbe con facilidad desde el tubo digestivo, su acción comienza entre los 15 a 30 minutos, se metaboliza en el hígado y se excreta principalmente por la orina su vida media plasmática es de aproximadamente de 11 horas. El Dextrometorfano Bromhidrato, principio activo del Pectos gotas, tiene una acción central para reducir y calmar los excesos de la tos en niños y adultos. Su efectividad en esta patología tan molesta ha sido demostrada en estudios muy bien controlados.

El Dextrometorfano a dosis útil produce menores efectos secundarios gastrointestinales. Su toxicidad es baja, pero a dosis muy altas puede producir depresión en el Sistema Nervioso Central.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

NIÑOS

De 2 a 6 años: 5 a 10 gotas cada 6 a 8 horas. (No superar 30 mg por día).

De 7 a 12 años: 10 a 20 gotas cada 6 a 8 horas. (No superar 60 mg por día).

ADULTOS:

20 a 40 gotas cada 6 a 8 horas. (No superar 120 mg por día).

CONTRAINDICACIONES

Debe evaluarse los beneficios en pacientes con asma bronquial y disfunción hepática. Pacientes con hipersensibilidad al Dextrometorfano.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se administrará con precaución en pacientes con asma y otras enfermedades respiratorias en las cuales hay secreciones espesas, porque este fármaco puede deteriorar la movilización de las secreciones.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

A dosis muy alta pueden presentarse confusiones, excitación, nerviosismo e irritabilidad, por ello la administración de este preparado a la dosis recomendada debe ajustarse a las indicaciones del médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso conjunto de IMAO, puede causar náuseas, hipotensión, excitación y coma; no administre Dextrometorfano a los pacientes con cualquier intervalo menos de dos semanas después de haber descontinuado los IMAO.

SOBREDOSIS

Las manifestaciones clínicas de sobredosis pueden incluir: Náuseas, vómitos,

mareo, visión borrosa, respiraciones superficiales, retención urinaria, psicosis tóxica, estupor y coma. El tratamiento de sobredosis comprende la administración de carbón activado, para reducir la absorción del medicamento y acudir al Centro de Emergencias Médicas.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo frasco de 15 mL.

Bandeja conteniendo 100 frascos de 15 mL (Presentación Hospitalaria).

Conservar en lugar fresco y seco a temperatura entre 15°C y 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Conservar en su envase original hasta su total utilización.

**“DR. LA SALUD DE SU PACIENTE ES TAMBIÉN
NUESTRO COMPROMISO”.**

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA.

**“La consulta médica regular, es uno de los pilares
de la Medicina Preventiva”.**

Consulte con su médico periódicamente.

**En caso de sobredosis comunicarse al Teléf: (021) 204 800.
del servicio de Emergencias Médicas, sito en la avda.**

Gral. Santos c/ Teodoro S Mongelos, o al 911.

Fabricado por

Laboratorios Almos S.A.

Administración y Planta Industrial

Ruta PY01, Km 20, N°: 3063,

Ciudad de Ypané. Departamento Central.

Paraguay.

Teléfono: (021) 614 313 R.A.

Dir. Téc: Qca. Fca. Teresa Tanaka - Reg. Prof. N°: 1.663.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Reg. Sanit. N°: 03658-06-EF

En caso de Reacciones Adversas al producto comunicarse a:

farmacovigilancia@siegfried.com.py

o al Teléfono: (021) 614 313 R.A.



SIEGFRIED

**VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA PARAGUAYA**